

# دازيد dazide

ENHANCE

## حبيبات تذوب في الماء WSG

منظّم نمو نباتي يستعمل للحصول على نباتات زينة وأزهار قطف عالية الجودة مكثيرة وقوية

### تحذيرات:

- يجب الالتزام بمعدلات الاستعمال المذكورة على الملصقة.
- يجب أن لا يزيد عدد الرشّات عن رشّتين خلال الموسم الواحد.
- يخزن في عبواته الأصلية المحكمة الإغلاق في مكان مأمون وجاف بعيداً عن الأطعمة والمشروبات والأعلاف ويعيداً عن تناول الأطفال.
- يجب عدم الأكل أو الشرب أو التدخين أثناء الاستعمال.
- يجب ارتداء الملابس الواقية أثناء الاستعمال.
- يجب غسل الجلد والعيون بالماء في حال الملامسة.
- تجنب استنشاق رذاذ الرش.
- يجب غسل اليدين قبل تناول الطعام وبعد الاستعمال.
- يجب عدم تلويث المياه السطحية بالمواد الكيماوية أو العبوات الفارغة.
- عدم التخزين في عبوات معدنية.

### الوكلاء والموزعون:

**Nabat**

شركة نبات للزراعة والتجارة م.م.  
Nabat Agricultural & Trading Co., Ltd.

عمان - الاردن

هاتف: ٤١٢٨١٣٦ / ٥٥١٤٣٩٥

رقم التسجيل لدى وزارة الزراعة الأردنية ( ٥٨١٨ )

### التركيب: يحتوي على ٨٥٠ غرام/كغم من المادة الفعالة Daminozide

### فوائد ودواعي الاستعمال:

- ينظم حجم نباتات الزينة عن طريق تقصير وتقزيم طول السلاخيات وتقسية وتقوية الأوراق والفروع وزيادة سماكتها.
- يحد من سيادة القمة النامية للنباتات ويشجع نمو الفروع الجانبية.
- ينشط النبات لتكوين البراعم الزهرية والأزهار.
- يقوي النبات ويزيد لونه الأخضر الداكن.
- يقوي الجذور والمجموع الجذري للنبات.

### يجب الانتباه إلى الأمور التالية عند رش دازيد على النباتات:

- التوقف عن الري لمدة ٢٤ ساعة بعد الرش.
- عدم الخلط مع أي مادة كيماوية أخرى.
- عدم المبالغة في زيادة تركيز محلول الرش ومراعاة التغطية الجيدة لكافة أجزاء النبات.

### تنبيه للمشتري:

إن الشركة الصانعة والمسوقة والبائع غير مسؤولين بأي حال من الأحوال عن أية آثار جانبية أو أضرار ناتجة عن تخزين وتداول واستخدام هذه المادة.

## الاستعمالات :

# دازيد

## dazide

ENHANCE

fine

Fine Agrochemicals Ltd.

Net Content: 1 Kilogram



Made in the EU

ملاحظات	مواعيد الاستعمال	معدل الاستعمال ♦ غرام / لتر ماء	المحصول
يكرر بعدها بعشرة أيام	عندما تكون الأفرع الجانبية بطول 2 سم	2,8	الكريزانتيمم (في القوارير)
يكرر بعدها بأسبوعين	قبل البدء بإزالة البراعم الجانبية	2,8	الكريزانتيمم ذو الزهرة الواحدة لكل ساق (قطف)
—	7 أيام قبل و 14 يوماً بعد البدء بتقصير طول النهار (التعتيم)	1,4 - 0,7	الكريزانتيمم السبراي (قطف)
—	عندما يصبح طول الأفرع الجانبية الجديدة 2-4 سم	1,5	البونسيتا (بنت القنصل)
—	عند مرحلة تكون 4-6 أزواج من الأوراق الجديدة	2,8	القرطاسية
—	عندما تبلغ النموات الجديدة طول 2 سم	2,8	الأزاليا
—	بعد مرحلة إزالة البرعم الرئيسي	2,8	الاجيراتيم وفم السمكة والبتونيا والمنثور والزينيا والسلفيا والقدسية

♦ يجب الالتزام بمعدلات الاستعمال المذكورة أعلاه.