

**PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS
ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS**

- P102: Manter fora do alcance das crianças.
- P270: Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
- P273: Evitar a libertação para o ambiente.
- P391: Recolher o produto derramado.
- P501: Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
- H412: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
- EUH210: Ficha de segurança fornecida a pedido (uso profissional).
- SPoPT1: Após o tratamento lavar cuidadosamente o material de proteção e os objetos contaminados. (Em caso de usar luvas, lavá-las também por dentro).
- SP1: Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem (Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície/ Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas).

Um produto:

fine

FINE AGROCHEMICALS LTD
Hill End House, Whittington
Worcester
WR5 2RQ, UK
Tel.: +44 1905 361800
Fax: +44 1905 361810

Exilis® é uma marca registada da
Fine Agrochemicals Limited

**exilis®**

**Solução concentrada (SL) com 20 g/L
ou 1,9% (p/p) de 6-benziladenina**

Regulador de crescimento de plantas

*Autorização de venda n.º 0511
concedida pela DGAIV*

**ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO
USO PROFISSIONAL.**

**PARA EVITAR RISCOS PARA OS SERES
HUMANOS E PARA O AMBIENTE,
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE
UTILIZAÇÃO**

Antes de usar o produto, leia o rótulo

Capacidade: 5 L

**Em caso de intoxicação contactar o
Centro de Informação Anti-Venenos,
Telef.: 808 250 143**



valorfito

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de recepção Valorfito; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

Manter o produto na embalagem original, bem fechada, ao abrigo da humidade e da geada.

Distribuído por:



COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.
Delegação de Portugal
Rua da Ajuda, 65 – 4350-017
PORTO
Tel./Fax: 225 099 133

EX/PT/5L/16F
V.1

O EXILIS é um regulador de crescimento das plantas indutor da queda dos frutos. A 6-Benziladenina é uma citocinina que promove a degradação estrutural das camadas de células especializadas da zona de abscisão e reduz a exportação de auxinas provenientes das sementes para a zona de abscisão.

Utilizações, concentrações, épocas e condições de aplicação

Macieira / monda dos frutos e aumento de tamanho dos frutos	Concentração	Volume de calda
Variedades fáceis de regular quimicamente: Braeburn, Granny Smith, Idared, Pink Lady, Golden delicious	0,375-0,5 L por 100 L de água	1000 L/ha
Variedades menos fáceis de regular quimicamente: Ariane, Elstar, Fuji, Gala, Rubens	0,5-0,75 L por 100 L de água	1000 L/ha

Aplicar o produto nos 30 dias seguintes à plena floração, quando os frutos têm um diâmetro compreendido entre 7 e 15 mm, em árvores adultas e nas concentrações referidas na tabela acima, para as variedades aí indicadas. Para árvores jovens, adaptar a dose e o volume/ha.

Tratar com uma quantidade de água suficiente para assegurar uma boa cobertura dos frutos e da vegetação, sem provocar escorrimento.

Uma boa monda é obtida quando a temperatura máxima se situa entre 20 e 25°C. As temperaturas da semana seguinte à aplicação devem ser superiores a 15°C para garantir boa eficácia na monda dos frutos. Temperaturas mais baixas reduzem a eficácia e aumentam a incidência de rugosidade. Temperaturas superiores a 28°C podem causar monda de frutos em excesso. Humidade superior a 70% favorece a penetração do produto e a sua eficácia.

A eficácia é reduzida se ocorrer precipitação nas 6 horas após a aplicação. Não aplicar EXILIS imediatamente após uma chuva; esperar até que os frutos estejam secos.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

- Dada a grande variabilidade de comportamento das culturas resultante da aplicação deste produto, o mesmo só deverá ser utilizado sob orientação técnica. aconselha-se a realização de ensaios prévios, nas variedades e condições em que o produto irá ser utilizado.
- Para qualquer nova variedade, fazer um teste de susceptibilidade varietal.
- O EXILIS é usado como parte de um programa, em associação ou sequência com outros produtos de monda dos frutos ou com a monda mecânica. Não misturar EXILIS com outros produtos fitofarmacêuticos ou fertilizantes.
- Existem diversos factores que influenciam a eficácia de um produto fitofarmacêutico. Embora a concentração/dose possa ser o factor principal, a eficácia alcançada com a concentração/dose recomendada, pode ser influenciada por outros factores, tais como as condições climáticas que ocorrem antes e após a aplicação do produto, o vigor do porta-enxerto, o sistema de condução, as práticas relacionadas com a poda, o nível de floração e o programa de regulação química utilizado na exploração.
- Respeitar os usos, doses, condições e precauções indicadas no rótulo, que foram determinados em função das características do produto e das utilizações para as quais está recomendado. Conduzir a cultura e os tratamentos de acordo com as Boas Práticas Agrícolas, tendo em conta, sob

responsabilidade do utilizador, qualquer factor particular da exploração, tais como tipo de solo, condições climáticas, métodos culturais, variedades de plantas, resistência das espécies, etc.

PREPARAÇÃO DA CALDA

No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Juntar a quantidade de produto a utilizar e completar o volume de água agitando sempre.

Utilizar uma água de diluição com pH entre 5 e 7. No caso particular de pH mais elevado, a adição de um adjuvante acidificante permitirá otimizar a eficácia do tratamento (consultar os serviços técnicos da empresa).

MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar correctamente o equipamento, para o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas) com especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda.

A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando as concentrações indicadas.

Utilizar equipamentos de aplicação devidamente limpos.

NOTA: Fine Agrochemicals Limited ("FINE") garante que este produto na sua embalagem original está em conformidade com as especificações indicadas no rótulo e no certificado de Autorização de venda emitido pela Autoridade Competente. FINE REJEITA QUALQUER OUTRA GARANTIA, EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADO, ÀS GARANTIAS DE QUALIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO E DE APTIDÃO A ALCANÇAR UM RESULTADO PARTICULAR OU UM NÍVEL MÍNIMO DE EFICÁCIA.

É impossível eliminar todos os riscos associados a este produto. Danos nas culturas, falta de eficácia, ou outras consequências não desejáveis podem resultar de factores como condições meteorológicas excepcionais, presença de outras substâncias, métodos de aplicação ou utilização do produto em desconformidade com as instruções constantes no rótulo, ou de qualquer outro factor fora do domínio da FINE ou do distribuidor. Tais riscos serão assumidos pelo comprador, em consonância com a legislação em vigor. E chamada em particular a atenção do utilizador para o facto que a monda dos frutos depende de muitos factores exógenos, incluindo a variedade, em particular a sua sensibilidade a agentes químicos de monda, a alternância e produção de frutos de pequeno calibre, as condições meteorológicas no momento do tratamento e nos dias seguintes, as condições de floração e polinização, a condução do pomar, o vigor das árvores.

O utilizador deve informar imediatamente a FINE ou o distribuidor sobre qualquer violação da garantia, e fornecer uma descrição detalhada da falta constatada. Se for confirmada a não-conformidade do produto, a responsabilidade da FINE é limitada ao montante do preço de compra ou, por decisão da FINE, a substituição gratuita do produto. FINE declina qualquer responsabilidade por danos excepcionais, acidentais ou indirectos resultantes do manuseamento ou da utilização deste produto

Nº lote e data de fabrico: ver na embalagem

Edição: 02

© Marca registada Fine Agrochemicals Ltd.

EX/PT/5L/16B

V.1