

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

Υγρό και αιμίο πολύ εύφλεκτο.
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό
Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάξτε το κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Μακριά από θερμότητα/ σπινθήρες/ γυμνάς φλόγες/ ή άλλες επιφάνειες. Να διατηρείται ο περιεκτής ερμητικά κλειστός. Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. Αποφύγετε να αναπνέετε ατμούς/ εκκενώματα. Γειωματοδυναμική σύνδεση του περιέκτη και του εξοπλισμού δέκτη. Να χρησιμοποιείται αντιεκρηκτικός ηλεκτρολογικός εξοπλισμός (φωτιστικός / εξοπλισμός. Να χρησιμοποιούνται μόνο εργαλεία που δεν παράγουν σπινθήρες. Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτά ή καλά αεριζόμενο χώρο. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. «Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν μακρύ παντελόνι, και μακρυμάνικο πουκάμισο εφόσον ευρέθουν στο πεδίο εφαρμογής αέρας μετά τον ψεκασμό». Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. **Πρώτες βοήθειες:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Απορρίψτε / Ξεβγάτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό/ρίσο ντους. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν οξεία ερεθισμοί ανατρέξτε τους εφόσον είναι εύκολα. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός/συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε διοξειδίου του άνθρακα για την κατάσβεση. Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Να διατηρείται δροσερό. Σε περίπτωση κατάσβεσης: Μην προκαλέσετε εμπόη ή χρησιμοποιήστε υγρά. Ζητείστε τεχνική συμβουλή. Τηλ. κέντρου δηλητηρίσεων: 2107793777

ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φ.π.και της συσκευασίας. Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρίπτυμα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια όταν αποθηκεύεται στην αρχική & απαροβίαστη συσκευασία του σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, σε θερμοκρασία ως 40°C.

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ - ΗΜ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας

falgro[®] SL

Πυκνό διάλυμα (SL)
Αρ. άδειας διάθεσης: 8239/05-10-2015

Εγγυημένη σύνθεση:
Gibberellic acid (γιββερελλικό οξύ): τεχνικά καθαρό 4% β/β
(αντιστοιχεί σε 3,6% β/β καθαρή δραστική ουσία)
Βοηθητικές ουσίες: 95,02% β/β

Φυτορρυθμιστική ουσία
Προάγει την επιμήκυνση των κτυρών
και χρησιμοποιείται για αύξηση της καρπόδεσης,
βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας
της παραγωγής σε αμπέλι, σεπεριδοειδή, αχλαδιά
και ακινάρα.

**ΠΡΟΟΡΙΖΑΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

Κάτοχος της άδειας:
Fine Agrochemicals Limited
Hill End House, Whitlington,
Worcester, WR5 2RQ, UK

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:



Χελλαφάρμ ΑΕ, Φλέμιγκ 15 151 23 Μαρούσι Τηλ: 210 6800900

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εσπεριδοειδή: Ποτικοαλά: Για βελτίωση της ποιότητας του φλοιού. Δόση 25-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού και ψεκαστικό όγκο 100 λίτρα/στρέμμα. Ένας ψεκασμός πριν την έναρξη του χρωματισμού των καρπών. Κλημενίνη, μαυτινάρια: Για προώθηση της καρπόδεσης. Δόση 25 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού και ψεκαστικό όγκο 100 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός στην πλήρη άνθηση-2/3 πώση πετάλων. Επανάληψη αν κριθεί αναγκαίο, ειδικά για παρατεταμένη περίοδο άνθησης. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ κάλ. περίοδο: 2 με μεσοδιάστημα 10-30 ημέρες ανάλογα με τη διάρκεια της περιόδου ανθοφορίας. Λεμονιά: Για καθυστέρηση ωρίμανσης, μείωση του αριθμού μικρών καρπών, αύξηση μεγέθους των καρπών. Δόση 25-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού και ψεκαστικό όγκο 100 λίτρα/στρέμμα. Ένας ψεκασμός πριν το χρωματισμό των καρπών. **Αχλαδιά:** Για προώθηση της καρπόδεσης στις ποικιλίες χαμηλής καρπόδεσης και της κανονικής ανάπτυξης των καρπών. Δόση 15-30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού όταν εφαρμόζεται μόνο του ή 7,5 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού όταν εφαρμόζεται σε συνδυασμό με Perlpan. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100 λίτρα/στρέμμα. Ένας ψεκασμός κατά την άνθηση (20-30% άνθησης – τέλος άνθησης).

Αμπέλι: Επιτραπέζια σταφύλια (όσπερμες ποικιλίες (Σουλτανίνα Thomson...)): Για επιμήκυνση βετρών, ένας ψεκασμός πριν την άνθηση σε βλαστούς 4-8 εκ. με δόση 75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού και ψεκαστικό όγκο 30-100 λίτρα/στρέμμα. Για αρωμία, ένας ψεκασμός στο 30-40% άνθησης, με δόση 75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού και ψεκαστικό όγκο 60-100 λίτρα/στρέμμα. Για μεγένθυση ραγών, δύο εφαρμογές, η 1η από την καρπόδεση μέχρι ράγες διαμέτρου 3-4 mm. Επανάληψη μετά 5-12 ημέρες για ομογενοποίηση του μεγέθους των ραγών. Δόση 75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού και ψεκαστικό όγκο 100 λίτρα/στρέμμα. Για αύξηση της καρπόδεσης και πρωίμηση της παραγωγής, δύο εφαρμογές, η 1η κατά την πλήρη άνθηση και η 2η 5-12 ημέρες αργότερα. Δόση 75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού και ψεκαστικό όγκο 100 λίτρα/στρέμμα. **Ονοπλοισμια αμπέλια:** Για αύξηση του μήκους των βετρών, ένας ψεκασμός πριν την άνθηση σε βλαστούς 10-15 εκ. με δόση 12,5-25 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού και ψεκαστικό όγκο 50 λίτρα/στρέμμα. **Σταφίδα (σουλτανίνα):** Για αύξηση μεγέθους ραγών, ένας ψεκασμός στο μέγεθος των ραγών είναι 3 χιλιοστά, με δόση 25 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού και ψεκαστικό όγκο 100 λίτρα/στρέμμα. **Σταφίδα (κορινθιακή):** Για μείωση πτώσης ανθέων και καρπών, αύξηση καρπόδεσης, ένας ψεκασμός κατά την πλήρη άνθηση, με δόση 12,5 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού και ψεκαστικό όγκο 100 λίτρα/στρέμμα. **Ακινάρα:** Για πρωίμηση της παραγωγής και βελτίωση της ποιότητας της. Δόση 25-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού και ψεκαστικό όγκο 40-100 λίτρα/στρέμμα. Πρώτη εφαρμογή με το σχηματισμό του κεντρικού άνθους της κεφαλής (1-2 αληθινά φύλλα). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών κάλ. περίοδο: 3 με μεσοδιάστημα 15-20 ημερές.

Παρατηρήσεις: - Χρησιμοποιείτε μεγάλους όγκους νερού για να εξασφαλιστεί καλή κάλυψη της καλλιέργειας. Προσαρμόστε τον ψεκαστικό όγκο στο στάδιο ανάπτυξης και τον όγκο βλάστησης της καλλιέργειας. - Για να εξασφαλιστεί καλύτερη απορρόφηση και αυξημένη αποτελεσματικότητα του FALGR0 4SL ψεκαστεί κατά προτίμηση όταν η σχετική υγρασία είναι υψηλή (το πρωί ή το βράδυ). Μην ψεκαζετε φυτά που υποφέρουν από έλλειψη νερού. - Μην αφήνετε το ψεκαστικό διάλυμα στον ψεκαστήρα για μεγάλο διάστημα (για παράδειγμα όταν διακόπτετε για εργασία ή για την επόμενη ημέρα).

1) Εσπεριδοειδή: Προσοχή: Όταν οι συνθήκες ανάπτυξης της καλλιέργειας δεν είναι ευνοϊκές ή εφαρμογή γιββερελλικού οξέος σε ορισμένες ποικιλίες εσπεριδοειδών όπως η Turkey, Valencia και η Bihahinnia Navel μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα.

Για καλύτερη απορρόφηση του γιββερελλικού οξέος, το pH του διαλύματος πρέπει να είναι 4-5.5. **2) Αχλαδιά:** Καλή ανταπόκριση στο FALGR0 4SL μπορεί να επιτευχθεί σε ποικιλίες όπως: Louise Bonne d'Anranches, Butira Giffard, Coscia, Gentilona, Passacrassane, Spadona, Spadocina, Triumph of Vienna, William. FALGR0 4L δεν πρέπει να εφαρμόζεται στην ποικιλία Doyenné du Comice. **Προσοχή:** Οι καλλιέργειες πρακτικές (κυρίως κλάδεμα και έλεγχοι ευρωστίας) και η λίπανση πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με το προσδοκώμενο φορτίο των δένδρων σε καρπούς. Η χρήση του FALGR0 4SL σε υψηλές δόσεις μπορεί να αλλοιώσει την μορφή των καρπών (επιμήκυνση) και να ελαττώσει την άνθηση του επόμενου χρόνου. **3) Αμπέλι:** Στις ονοπλοισμιας ποικιλίες (Chardonnay, Picalin, Tocai, κλπ), η εφαρμογή FALGR0 4SL βελτιώνει το μήκος των βετρών με αποτέλεσμα να γίνονται λιγότερο συμπυκνιστά και να ελαττώνεται η πιθανότητα προσβολής από βουτράνη (Botrytis cinerea). Η χρήση του FALGR0 4SL σε μέγιστο βετρίου με ένα προσκολλητικό βελτιώνει τη διεύθυνση και την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. **Προσοχή:** Σε πολύ ευπαθείς ποικιλίες όπως η Riesling χρησιμοποιήστε το FALGR0 4SL σε μειωμένη δόση. **4) Ακινάρα: Προσοχή:** Για να επηρεληθούμε από τα ηλεονεκτήματα της χρήσης του FALGR0 4SL και να επιτευχθεί η επιθυμητή αύξηση της παραγωγής πρέπει να αυξηθούν ανάλογα η λίπανση και η άρδευση. Υπάρχει πιθανότητα ανεπιθύμητων επιδράσεων στις ποικιλίες Romanesco & Spinosa.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος πλήρους κάλυψης μέχρι απορρόφηση. **Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού διαλύματος:** Αφού υπολογίσετε την ποσότητα FALGR0 4SL που απαιτείται για τον όγκο ψεκαστικού υγρού που θα εφαρμόσετε γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό υπό ανάδευση. Συμπληρώστε στο ψεκαστικό το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση. **Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** Αμέσως μετά την εφαρμογή ξεπλύνετε το ψεκαστικό δοχείο με λίγο καθαρό νερό και ψεκαστείτε στην ψεκασμένη περιοχή αδειάζοντας τελείως τον ψεκαστήρα. Αραιώστε όλα τα ορατά υπολείμματα και από το εξωτερικό του ψεκαστικού ξεπλένοντας με καθαρό νερό. Ξεπλύνετε και πάλι το εσωτερικό του ψεκαστικού με καθαρό νερό και αδειάστε τελείως το νερό ξεπλύνοντας μέσω του συστήματος ψεκασμού (το νερό που θα χρησιμοποιήσετε για το ξέπλυμα να είναι τουλάχιστον 1/10 του όγκου που χωράει το βυτί). Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχάνημα. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό με ήλμη νερά το νερό του καθαρισμού κοντά σε υδάτινους πόρους. **Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** Δεν θα πρέπει να εισέρχεται στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τις επιφάνειες των φυλλών. **Φυτοτοξικότητα:** Η χρήση γιββερελλικού οξέος μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα σε ορισμένες ευπαθείς ποικιλίες εσπεριδοειδών όπως η Turkey Valencia και Bihahinnia Navel, όταν οι συνθήκες ανάπτυξης των δένδρων δεν είναι ευνοϊκές. Κατά τα άλλα δεν υπάρχουν ενδείξεις για παρενέργειες όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. **Συνδυαστικότητα:** Μην το αναμειγνύετε με άλλα προϊόντα εκτός από το Perlpan. Κατά το συνδυασμό με Perlpan διατηρείτε συνεχώς το μέγιστο ανάμιξη και χρησιμοποιήστε το άμεσα (χρήση σε λιγότερο από 3 ώρες υπό διαρκή ανάμιξη). Δεν πρέπει να αναμειγνύεται με λάδια και αλκαλικά μέγμματα όπως ο βορβινγάλλιος πολτός ή το βεισβεστίο. Το FALGR0 4SL δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν και μετά την εφαρμογή βερινού πολτού επειδή επηρεάζεται αρνητικά η απορρόφηση του. **Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:** Δεν απαιτείται.