

فالفغرو أقراص

Falgro™ TABLETS

Gibberellic acid (GA₃) 12% (w/w) ١٢٪ (و/و)جيبيريك أسيد
Inert materials.....88% (w/w) ٨٨٪ (و/و)مواد مضادة

فالفغرو منظم نمو نباتي
لتحسين عقد و حجم الثمار و لزيادة الإنتاج

يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال

fine Fine Agrochemicals-LTD, UK المنتج:

الشركة المستوردة و الموزعة: يونيفرت ش.م.ل.
شارع بربر أبو جودة-البوشرية
تلفون: ٠١/ ٨٩٧٧٦٣

unifert s.a.l.

Date of manufacturing : تاريخ الصنع
Expiry Date: تاريخ انتهاء الصلاحية
Batch number : رقم الارسالية:

المحتوى الصافي: ٧,٥ غرام/قرص
أنبوب من عشرة أقراص

FAL/TA/10/LB/16



المحصول	ملاحظات حول طرق الاستعمال	نسبة الاستعمال
الإجاص	لتثبيت عقد الثمار يستعمل خلال ٢٠-٣٠٪ من بداية الإزهار	١-٢ قرص/١٠٠ لتر
العنب (دون بذر)	رشة واحدة قبل الإزهار لإطالة العنقود تفريد الثمار في العنقود، رشة واحدة خلال ٣٠٪ من بداية الإزهار زيادة حجم الثمار، رشة واحدة عند عقد الثمار	١٠-١٥ قرص/هكتار ١٠-١٥ قرص/هكتار ١٠-١٥ قرص/هكتار
الليمون و الحامض	لتأخير نضوج الثمار. يستعمل رشة واحدة عند النضوج أي قبل بداية تغيير لون الثمار	١-٢ قرص/١٠٠ لتر
البطاطا	لتحفيز البطاطا على التفريخ، تغطس الدرنات المقطعة قبل الزرع في المحلول	١ قرص/٢٠٠ لتر

ملاحظات: يحضّر محلول فالغرو فوراً قبل الاستعمال و يرش بشكل رذاذ ناعم قبل انقضاء ٢٤ ساعة على تحضيره - يجب عدم رش المبيد في الحرارة المرتفعة - إن سقوط أمطار قوية خلال مدة تقلّ عن ٨ ساعات بعد الرش قد تضعف من فعالية المادة، في هذه الحالة يتوجب إجراء رشة أخرى بمعدل نصف التركيز العادية من فالغرو. يجب عدم إجراء هذه الرشة الثانية على الإجاص.

قابلية المزج: قابل للمزج مع معظم المبيدات الزراعية ما عدا القلوية منها كما ينصح و يفضل مزجه مع المغذيات الورقية اللازمة لتأمين احتياجات زيادة و تحسين عقد الثمار.

فترة الأمان: ٢٠ يوم قبل القطاف.

فترة الانتظار قبل دخول الحقل: ٢٤ ساعة.

توصيات عامة:

١- ضغط 40PSI أو 2.76Bar.

٢- رذاذ حجم القطرة 200 - 400 ميكرون.

٣- لانس مفتوح ناعم.

٤- معدل رش الهكتار حوالي 1000 لتر، و قد يزيد أو ينقص حسب حجم الأوراق.

خصائص فالغرو: تحتوي أقراص فالغرو على ٠,٩ غرام من مادة الجيبرليك أسيد GA3 و يزن القرص الواحد ٧,٥ غرام. يعمل فالغرو على تحسين عقد الثمار و زيادة الإنتاج في الحمضيات، الإجاص، العنب و غيرها من المحاصيل الزراعية.

إحتياطات السلامة: يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند رش المبيد مثل ارتداء الملابس الواقية و غسل اليدين بعد عملية الرش. يجب عدم التدخين، الشرب و الأكل أثناء الرش و عدم تنشق المبيد أو رذاذ الرش و تجنّب ملامسة المبيد للجسم أو العين.

عبارات تحذيرية: عدم الرش عند هبوب الريح.

الاستعمال الصحيح للمبيد: يضاف قرص واحد من فالغرو بلتر واحد من الماء و يحرك جيدا" و يرش على النبات بشكل رذاذ ناعم.

الإسعافات الأولية: إبعاد المصاب عن مصدر التعرّض للمبيد و استدعاء الطبيب فوراً".
في حال تنشق رذاذ المبيد ينقل المصاب إلى مكان حسن التهوية. في حال ملامسة المبيد للجلد، يتمّ نزع الثياب الملوثة و غسل الجلد بالماء و الصابون. في حال ملامسة المبيد للعين، تغسل جيدا" لمدة ١٥ دقيقة على الأقل. في حال ابتلاع المبيد، يجب إعطاء المصاب كمية وافرة من الفحم الطبي و الماء و يحظر إعطاء أي شيء عن طريق الفم إذا كان المصاب فاقد الوعي و يتمّ استدعاء الطبيب فوراً".
ترياق مضاد: لا يوجد. عالج حسب الأعراض.

التأثير على البيئة: غير سام للنحل و للطيور، سام للأسماك و الأحياء المائية.

درجة السمية: WHO IV حسب منظمة الصحة العالمية.

التخلص من الأكياس الفارغة: يجب غسل الأكياس الفارغة ثلاث مرات بالماء و إعادة مياه الغسيل إلى خزان الرش و تعبها و حفظها في مكان آمن بعيداً عن مصادر المياه.

المسؤولية القانونية: إنّ المنتج و الموزع يضمنان جودة المادة لكن طالما ليس لهما أي إشراف على استعمال أو تخزين هذا المبيد فإنهما لا يتحملان أي مسؤولية قد تنتج عن سوء الاستعمال.