

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα:** Μην το αναμιγνύετε με άλλα προϊόντα εκτός από σκευάσματα γιβερρελλικού οξέος.

**Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** Δεν θα πρέπει να εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τις επιφάνειες των φύλλων.

**Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:** Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες δόσεις, στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της χώρας.

**Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:** Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια όταν αποθηκεύεται στην αρχική & απαραβίαστη συσκευασία του σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο.

**Πρώτες βοήθειες -Αντίδοτο**  
Σε περίπτωση εισπνοής:  
μετακινήστε τον παθόντα σε καλά αεριζόμενο χώρο και διατηρήστε τον (ζεστό και σε άνετη θέση).

Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:  
Απομακρύνετε τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε το δέρμα με νερό και σαπούνι. Αν παρουσιαστεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ρίξτε τρεχούμενο νερό στα μάτια επί 15 λεπτά. Ζητήστε ιατρική παρακολούθηση.

**Κάτοχος της έγκρισης-**

**fine**  
FINE AGROCHEMICALS LIMITED  
Hill End House, Whittington  
Worcester, WR5 2RQ, UK  
E: enquire@fine.eu  
www.fine.eu

\*Perlan είναι εγγραμμένο σκευάσμα της Fine Agrochemicals Ltd.

**perlan**<sup>®</sup>  
SL

ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ (SL)

AEK: 8250/20-4-2016

**Εγγυημένη σύνθεση:**

Gibberellin (Γιββερελίνη) A4/7 1.9% β/ο +  
6-benzyladenine (6-βεν(υλαδενίνη) 1.9% β/ο  
βοηθητικές ουσίες: 96.2% β/β

Φυτορρυθμιστική ουσία για την αντιμετώπιση της σκωροχρώσης και τη βελτίωση των καρπών της μηλιάς

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Υπεύθυνος επικοινωνίας-Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

**ελίταφάρ**  
XΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ, Φιλεργκ 15, 15123 Μαρούσι, Αθήνα,  
Τηλ. 210 6800900, e-mail info@hellafarm.gr

Σε περίπτωση κατάποσης:  
Ξεπλύνετε το στόμα, πιείτε νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 77 93 777

**Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:** Υπό ειδικές συνθήκες, η εφαρμογή μπορεί να μειώσει την ανθοφορία την επόμενη χρονιά.

**Διαβάστε τις συνημμένες οδηγίες πριν από τη χρήση**

Αρ. παρτίδας-Ημ. παρασκευής: βλέπε άνω μέρος της φιάλης

**Περιεχόμενο:**  
500 κ.εκ

152 mm

154 mm

Page 2 - Reverse of Top Visible Panel

Page 3

## ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ

Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Μην αναπνέετε τα ψεκαστικά εκνεφώματα. Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα. «Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής αμέσως μετά τον ψεκασμό».

**ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.**

Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά στα επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους. Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

## ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΣΤΟΧΟΣ-ΔΟΣΙΣ

Μηλιά για:

α) Σκωροχρώση, Μείωση σκασίματος των καρπών. Δόση: 25-30 κ.εκ/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (max 30 κ.εκ./στρ) με όγκο ψεκαστικού υγρού 30- 100 λίτρα /στρέμμα. Απαιτούνται συνολικά 4 εφαρμογές. Έναρξη εφαρμογών στο τέλος της άνθησης- πτώση πετάλων. Οι υπόλοιπες εφαρμογές σε διάστημα 7-10 ημερών. Μεγ. αρ. εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 4

β) Βελτίωση του μεγέθους, του βάρους και του σχήματος των καρπών. Δόση: 50-125 κ.εκ/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (max 125 κ.εκ./στρ) με όγκο ψεκαστικού υγρού 100 λίτρα /στρέμμα. 1 εφαρμογή κατά την άνθηση με δόση 100-125 κ.εκ/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού είτε 2 τμηματικές εφαρμογές ως εξής: η 1η κατά την πλήρη άνθηση και η 2η 3-10 ημέρες αργότερα με δόση 50-60 κ.εκ/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Μεγ. αρ. εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 ή 2

## Παρατηρήσεις:

1. Οι ψεκασμοί πρέπει να γίνονται τις πρωινές ή απογευματινές ώρες, όταν η σχετική υγρασία είναι υψηλή οπότε εξασφαλίζεται καλύτερη απορρόφηση και αποτελεσματικότητα του προϊόντος.
2. Να μην εφαρμόζεται όταν η θερμοκρασία είναι μικρότερη από 7 °C ή μεγαλύτερη από 32 °C.
3. Μην το χρησιμοποιείτε όταν προβλέπεται ότι θα βρέξει μέσα σε 4-6 ώρες από την εφαρμογή.
4. Η εφαρμογή να γίνεται όταν τα δέντρα είναι στεγνά.
5. Προσαρμόστε τον ψεκαστικό όγκο ανάλογα με το μέγεθος των δένδρων για να πετύχετε καλή κάλυψη της βλάστησης.
6. Μην αφήνετε το ψεκαστικό διάλυμα στον ψεκαστήρα για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. κατά τις διακοπές για φαγητό ή για την επόμενη ημέρα).
7. Όταν ανοίξετε μια συσκευασία χρησιμοποιήστε όλο το περιεχόμενο της κατά την καλλιεργητική περίοδο που ανοίχτηκε. Μην το αφήνετε για τον επόμενο χρόνο.

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμός φυλλώματος πλήρους κάλυψης μέχρι απορροής

**Τρόπος παρασκευής του διαλύματος εφαρμογής:** Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό υπό ανάδευση. Συμπληρώστε στο ψεκαστικό το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση. Διατηρήστε την ανάδευση και κατά τον ψεκασμό. Ελέγξτε το pH του ψεκαστικού διαλύματος και αν χρειαστεί, ρυθμίστε το pH του νερού στο 5-7 χρησιμοποιώντας κατάλληλο προϊόν.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό.