



적용대상 및 사용량

(병뚜껑 용량 : 50ml)

| 작물명 | 적용대상 | 사용적기 | 물 20 l 당 사용약량 | 1,000㎡ (10a)당 사용량 | |
|-------------|------------|----------------------------------|------------------|-------------------|-------|
| | | | | 약량 | 살포량 |
| 사과 (후지) | 과실 비대촉진 | 중심화 만개시 1차처리후 5~7일후 2차 수관전면처리 | 20ml | 150ml | 150 l |
| 사과 (쓰가루) | | 전체 만개시 1차처리후 5~7일후 2차 수관전면처리 | | | |

안전사용기준

| 작물명 | 사용적기 | 사용횟수 |
|-------------|---------------|------|
| 사과(후지, 쓰가루) | 낙화후 20일전까지 사용 | 3회이내 |

특징

- 이 농약은 식물생장조정제로써 세포신장, 세포분열촉진 및 동녹방지 효과가 있는 지베렐린 에이포세분과 착과증진, 세포분열 및 내성증진 효과에 관여하는 육-비에이의 혼합제입니다.
- 이 농약은 과실의 비대촉진 뿐만 아니라 동녹방지 효과도 있습니다.
- 이 농약은 꽃잎과 초기 어린과실로 흡수되어 비대촉진 효과를 나타냅니다.
- 이 농약은 과실의 착과를 안정하게 해주며, 꿀벌의 방화활동에는 영향을주지 않습니다.

해독방법

- 중독증상이 있을 때에는 즉시 작업을 중단하고 안정을 취할 것이며 의사의 지시를 받으십시오.
- 잘못하여 마셨을 때에는 바로 소금물을 먹여 토하게 하고 의사의 치료를 받으십시오.
- 이 농약은 원액이나 희석액이 눈에 들어갔을 때에는 즉시 깨끗한 물로 씻어 주고 의사의 치료를 받으십시오.

안전 및 기타 주의사항



- 이 농약은 약한 안자극성이 있으므로 마스크, 보안경, 고무장갑, 방제복을 착용하고 눈에 들어가지 않도록 주의하여 바람을 등지고 뿌리시되 작업후에는 입안을 물로 헹구고 손, 발, 얼굴 등을 비누물로 깨끗이 씻으십시오.
- 사용 후 남은 희석액과 살포기를 씻은 물은 하천 등에 흘러 들어가지 않도록 안전하게 처리하십시오.
- 병뚜껑을 열 때 신체(눈, 코, 입, 피부 등)에 내용물이 묻지 않도록 주의하십시오.
- 본 제품은 농약이므로 다른 용기에 옮겨 보관하지 마십시오.
- 신체에 이상(감기, 알레르기, 임신, 천식, 피부병 등)이 있을 때에는 약제 살포 및 취급을 금합니다.
- 이 농약은 영하 20℃이하에서 얼 우려가 있으므로 주의하시고, 만일 제품이 얼은 경우라도 상온에서 서서히 녹여 사용하시면 제품의 효과에는 영향이 없습니다.
- 이 농약은 잘 밀봉한 뒤 햇빛을 피하여 건조하고 서늘한 곳에 보관하십시오.

성분

유효성분 : Gibberellin A4+7 1.8%

6-benzylaminopurine 1.8%

기 타 : 보조제, 용제 96.4%

● 사용 전에 표기내용을 잘 읽을것 ● 표기내용 표시사항 이외에는 사용하지 말 것 ● 어린이 손이 닿는 곳에 놓거나 보관하지 말 것

생장조정제 **농약** 등록번호:64-생조-3

펠란 액제

품목명 : 지베렐린에이포세분 · 육-비에이 액제

500ml

제조원

fine(독일)

수입 · 판매원



(주)신영아그로
서울시 강남구 도곡로 3길 25
대표전화 : 02) 538-8933

저독성

사용방법

- 에스에스 분무기의 살포입자를 미세하게 하여 약액이 흐르지 않을 정도로 꽃잎과 수관 전체에 균일하게 묻도록 살포하십시오.
- 살포액이 빨리 마르지 않는 해질무렵 또는 이른아침에 바람이 불지 않을때 살포하십시오.
- 살포물량은 1,000㎡당 150 l 를 기준으로 하되 나무크기 및 재식밀도에 따라서 알맞게 조절하여 살포하십시오.
- 약제 살포시 약제가 수관 윗부분에 살포되어 위에서 아래로 떨어져 약액이 균일하게 묻도록 살포하십시오.
- 우수한 비대효과를 나타내기 위해서는 반드시 수분, 수정이 잘되고 개화기 기상 환경이 양호한 곳에서 사용하십시오.
- 약제처리후 적과작업, 비배관리 및 기타 관리는 정상적으로 실시하고 과실비대기의 토양수분 관리를 철저히 하십시오.
- 표기내용의 표기사항이 이해가 되지 않거나 의문사항이 있을 경우에는 (주)신영아그로에 문의하십시오.

취급제한기준

- 이 농약은 **의약품, 식료품 또는 사료의 보관장소와 구분하여 보관하십시오.**
- 사용한 빈 농약용기를 마을 수집장에 모아두면 농협 또는 한국환경공단에서 수거하고 있습니다. (한국환경공단에서 현금지급함)
- 기타 자세한 사항은 (주)신영아그로에 문의하십시오.

약효 · 약해에 관한 주의사항

- 이 약제는 생장조정제이므로 다른 농약 등과 절대로 섞어 뿌리지 마십시오.
- 이 약제는 수분, 수정이 잘 안되는 곳과 개화기 기상이 불량한(저온, 강우, 바람 등) 경우에는 사용하지 마십시오.
- 수세가 약하거나 가뭄, 동해를 받은 나무에는 절대사용을 피하십시오.
- 강우가 예상될 때에는 가급적 약제살포를 피하시고 약제살포후 6시간 이내에 비가올 경우 약효가 떨어지므로 주의하십시오.
- 바람이 강하게 불거나 온도가 높고 건조한 한낮에는 약제살포를 하지마십시오.
- 사용방법을 잘 지키시고 살균제, 살충제, 영양제 등 다른 약제와는 절대로 혼용하여 사용하지 마십시오.
- 과량살포로 약액이 꽃잎에서 흘러내리지 않도록 하십시오.
- 기온이 4℃이하의 저온 또는 30℃이상 고온일 경우에는 약제살포를하지 마십시오.
- 수정 불량으로 인해 종자형성 및 발육이 정상적으로 되지 않는 조건(개화기 기상조건이 불량한 경우와 수정이 잘 안되는 지역 등)에서 이 약제를 사용하면 과실중경의 비대 차이로 인하여 상품성이 저하될 경우가 있으니 주의하십시오.
- 살포전, 후 살포기를 반드시 씻으십시오.

※ 적용대상 작물 이외에는 사용하지 마십시오

약효보증기간 : 2016. 10. 31 까지

모 집 단 번 호 : 1311-1