



豪大果 (勃寧激素)

3.6% 溶液



農用藥劑

內容量：500毫公升

興農股份有限公司

農藥許可證農藥進字第02673號

一、有效成份：

gibberellin A4 with A7

(3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hydroxy-3-methyl-6-methylene-2-oxoperhydro-4a,7-methano-3,9b-propanoazuleno[1,2-b]furan-4-carboxylic acid (gibberellin a4) and
(3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hydroxy-3-methyl-6-methylene-2-oxoperhydro-4a,7-methano-9b,3-propanoazuleno[1,2-b]furan-4-carboxylic acid (gibberellin a7) (勃寧素A4&A7).....1.8%
6-benzyladenine

N-phenylmethyl-1H-purin-6-amine (苄寧激素).....1.8%

二、其他成份：.....96.4%

三、理化性狀：無色澄清液體。

四、使用方法及範圍：

使用範圍	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期及方法	注意事項
蘋果 生長調節		500 ~ 1000	於蘋果盛花時將藥液直接噴至花上一次即可。	1. 勿使用於六年生以下之幼樹。 2. 施藥量以噴至全面濕潤為度，勿使藥液滴下。 3. 宜於下午陰涼時施藥。

五、使用時注意事項及預防中毒與解毒方法：

1. 本劑應貯存於陰涼乾燥及小孩不易接觸之處。
2. 施藥時切勿吸菸或飲食。
3. 本藥劑可提高蘋果產量、改善果形。
4. 藥液需噴成霧狀，藥液粒子越細越好，切勿噴成淋洗狀。



5. 請依傳統作業方式，分次進行疏果，切勿於幼果期因效果明顯而一次完成疏果。
6. 因不慎而皮膚觸及藥劑，應立即用清水及肥皂洗淨。如有疑問請洽台北榮民總醫院之毒藥物防治諮詢中心，電話：(02)2871-7121
7. 請勿於溫度高、蒸發快或風大時施用。

六、農藥廢容器清洗及回收方法：

1. 農藥廢容器清洗方法：農藥空瓶包括塑膠瓶、玻璃瓶、鋁罐等，於農藥用完後空瓶(罐)用清水清洗三次，其清洗水應供農藥稀釋液使用，勿隨意傾倒，以防污染。
2. 農藥廢容器回收方法：
 - (1) 使用後廢容器集中存放。
 - (2) 丟入農藥廢容器回收桶。
 - (3) 送交農藥廢容器回收站。
 - (4) 數量集中達十公斤以上者，請撥免費回收電話：(0800)021811

國外製造廠商地址：

SCHIRM GMBH Betriebsstätte Lübeck

Mecklenburger Strasse 229 D-23568 Luebeck, GERMANY.

總經理及分裝工廠：

興農股份有限公司

公司：台中市梅川西路一段23號

電話：(04)2372-6181(代表號)

工廠：台中縣大肚鄉中和村中山路111號

電話：(04)2693-3841(代表號)

製造日期：

及批號：

有效期限：

分裝日期：

植物生長調節劑