

İmal Tarihi: Ambalaja Bakınız

Son Kullanma Tarihi: Ambalaja
Bakınız

Şarj Numarası: Ambalaja Bakınız

Ruhsat Tarihi ve Numarası:
14.09.2011 / 8403

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ :
Karakteristik bir zehirlenme belirtisi yoktur.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:
Herhangi bir zehirlenme durumunda aşağıdaki ilk yardım tedbirlerini alınız. Solunması halinde etkilenen kişiyi tıy havalandırılan bir yere çıkarın. Hemen tıbbi yardım sağlayın. İlaçla bulaşık elbiseleri çıkartın. Deriyle teması halinde bol su ve sabunla yıkayın. Gözlere bulaşması halinde gözleri en az 15 dakika boyunca bol suyla yıkayın ve tıbbi yardım sağlayın. İçebilecek durumda ise bir bardak su içinin, doktor önermedikçe kusturmaya çalışmayın. Hastanın bilinci yerinde değilse ağızdan birşey vermeyin. Etiketi beraberinde tıbbi yardım merkezine götürün

ANTİDÖTU VE GEREKLİ BİLGİLER:
Bilinen bir antidötu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

Net miktar: 5 litre
Azami perakende satış fiyatı: Ambalaja
TEHLİKE ÖZELLİĞİ Bakınız
Yoktur
TEHLİKE SEMBOLÜ
Sınıflandırılmamıştır.

fine
FINE AGROCHEMICALS LIMITED
Hill End House Whittington
Worcester WR5 2RQ UK
www.fine.eu



SUMI AGRO TURKEY
TARIM İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

exilis®

**BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİSİ
SUDA ERİYEİLİR SIVI (SL)**

**Etkili Madde: Litrede 20 g saf 6-Benzyladenine içerir.
N-phenylmethyl-1 H-purin-6-amiline**

- **ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.**
- **EVDE KULLANMAYINIZ.**
- **ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.**
- **BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VEVEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.**
- **BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.**
- **İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIMI TALİMATINA UYUNUZ.**
- **MASKE, KORUYUCU ELBİSE ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.**
- **BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.**
- **KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BOŞ AMBALAJININ ¼ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞİ 3 KEZ TEKRARLAYINIZ.**

• TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZFN) TEL: 114



İÇİNDEKİLER

6-Benzyladenine (6-BA)
UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI
R22-Yutulması halinde zararlıdır.
GÜVENLİK İBARESİ VE

AÇIKLAMASI
S2-Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

S13-Yıyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

S20/21-Kullanım sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin.

S35-Bu madde ve kabı güvenli bir biçimde bertaraf edilmelidir.

S36/37-Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın.

S46-Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

FİRMA BEYANI:

İlaçın kullanımı bizim kontrolümüz dışında olduğundan, hatalı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firma mesuliyet kabul etmez. İlaçın spesifikasyonu uygunluğu, sadece ilacı teslim sırasında firma garantisi altındadır.

İMALATÇI FİRMA:

FINE AGROCHEMICALS LTD.
Hill End House Whittington Worcester
WR 5 2RQ – U.K.
RUHSAT SAHİBİ VE İHTALATÇISI:
SUMI AGRO TURKEY
TARIM İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Maslak Mah. Meydan Sokak Beybi
Giz Plaza No.1 K.18
34398 Sarıyer/İSTANBUL
Tel: 0 (212) 290 2560 (pbx)
Fax: 0 (212) 290 2575-76

İMAL YERİ:

Schirm GmbH Sideco
Mecklenburger Strasse 229, D-23568
Lübeck, Almanya

KULLANILACAĞI BİTKİ VE KULLANMA AMACI:

BİTKİ ADI	BİTKİ ÇEŞİDİ	Kullanım Amacı ve Dönemi	Dozu	Son ilaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Elma	Starkrinson Delicious, Golden Delicious	Seyreltmek için Meyve 10-12 mm çap'ta iken	750 ml/ 100 l su	-

KULLANMA ŞEKLİ:

Elma ağaçlarında kullanılan bir bitki gelişim düzenleyicisidir.Çiçek sonrası kullanılan bir seyrelticidir.Meyve ağırlığını artırabilir ancak bu ağacın fiziksel koşullarına ve meyve tutumuna bağlıdır.Klasik ilaçlama ekipmanıya uygulanmalı, sulama ekipmanı ile verilmemelidir.İlacın etkinliği uygulama yapılacak elma çeşidine bağlıdır.İlaçlı mahlulun % 80 i ağacın 2/ 3 üne püskürtülmelidir. Kalibrasyonu yapılmış tabanca kullanınız ve ağacın tümünün eşit olarak ve damlama yapmayacak şekilde iyice kaplanmasına dikkat ediniz. Gerekli ilaç miktarı önce bir miktar su ile ayrı bir kapta karıştırılır. İlaçlama aleti yarısına kadar su ile doldürülerek içine bu karışım dökülür ve kalan su miktarı ilave edilerek karıştırılır. İyi sonuç elde etmek için ağacın her yönünü iyice ıslatacak şekilde pulverize ediniz. Uygulandıktan sonra kuruması için yeterli zaman geçmelidir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Tek başına kullanılması önerilmektedir. Bazı çeşitler NAA uygulandığında pigme meyve oluşturmaya duyarlıdır. Bu çeşitlere NAA ile tank karışımı yapılarak uygulanması sakıncalıdır.Tank karışımı yapmadan önce firmasına danışınız.Etkinliği denenmemiş kimyasallarla tank karışımı yapılması durumunda alınan sonuçlardan firmamız mesuliyet kabul etmez.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Tavsiyeye uygun kullanıldığında fitotoksik değildir İlaç 24°C altında serin, kuru ve iyi havalandıran yerlerde muhafaza ediniz. İlaç kendi ambalajında, ağzı kapalı olarak saklayınız. Boş ilaç ambalajlarını, atık tasfiyesinin tehlike oluşturmayacağı bir yerde, yakma yoluyla veya başka bir uygun yöntemle imha edin. Uygulama öncesi ve sonrası yüksek sıcaklık (21-24 C)ve ağacın maruz kaldığı hastalık ve fizyolojik stress EXILIS'in etkisini artırır. Bu durumlarda dozun azaltılması gerekir. Aksine uygulamadan önce ve sonra düşük sıcaklıklar etkisini azaltır, 16 C altında uygulamayınız, Uygulamadan hemen sonra yağmur yağarsa uygulamayı tekrar ediniz. Exilis suyun pH 'sı 5 – 6,5 arasında ise en iyi sonucu verir. Bu amaçla bir pH düzenleyici kullanılmıdır

DEPOLAMA DURUMU:

Serin ve kuru bir yerde, orjinal ambalajında ağzı kapalı olarak depolandığında imal tarihinden itibaren 3 yıl süreyle kullanılır.

