

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένα. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν μακριά παντελόνι και μακριμάνικο πουκάμισο εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής αμέσως μετά τον ψεκασμό. Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτα:

Σε περίπτωση εισπνοής: μετακινήστε τον παθόντα σε καλά αεριζόμενο χώρο και διατηρήστε τον ζεστό και σε άνετη θέση. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. (συνεχίζεται δίπλα)

Κάτοχος της άδειας:

fine
FINE AGROCHEMICALS
LIMITED
11 End House Whittington
Worcester WR5 2SQ UK
E enquire@fine.eu
www.fine.eu



GIBBERELLIN A4/7 (ΓΙΒΒΕΡΕΛΛΙΝΗ A4/7) 1% ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ (SL)

Αρ. άδειας διάθεσης: 8235/5.8.2015

Εγγυημένη σύνθεση:
Gibberellins A4/7 1% β/ο
βοηθητικές ουσίες: 98.97% β/β

**Φυτορρυθμιστική ουσία
για την αντιμετώπιση της
σκωριόχρωσης της
μηλιάς και τη βελτίωση της
καρπώδεσης της αχλαδιάς**

Προορίζεται μόνο για
επαγγελματίες χρήστες



NOV/GR/1/16

Περιεχόμενο:
1 ΛΙΤΡΟ

Αρ. παρτίδας- Ημ. παρασκευής:
βλέπε άνω μέρος της φιάλης

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Απομακρύνετε τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε το δέρμα με νερό και σαπούνι. Αν παρουσιαστεί ερεθισμός ζητείστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ρίξτε τρεχούμενο νερό στα μάτια επί 15 λεπτά. Ζητείστε ιατρική παρακολούθηση.
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα, πιείτε νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Τηλ. κέντρου δηλητηριάσεων: 2107793777

**Διαβάστε τις
συνημμένες
οδηγίες πριν από
τη χρήση**

Υπεύθυνος για την τελική
διάθεση στην αγορά:



ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ,
Φλεμινγκ 15, 15123
Μαρούσι, Αθήνα,
Τηλ. 210 6800900,
e-mail info@hellafarm.gr

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ- ΣΤΟΧΟΣ- ΔΟΣΕΙΣ

Μηλιά: για αντιμετώπιση της σκωριόχρωσης και βελτίωση της ποιότητας του φλοιού. Δόση 25-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30-100 λίτρα /στρέμμα. Απαιτούνται συνολικά 4 εφαρμογές. Έναρξη εφαρμογών στο τέλος της άνθησης- πτώση πετάλων. Οι υπόλοιπες εφαρμογές σε διάστημα 7-10 ημερών.

Αχλαδιά: για βελτίωση της καρπώδεσης προάγοντας την ανάπτυξη παρθενοκαρπικών καρπών. Είτε 1 εφαρμογή κατά την άνθηση με δόση 120 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού, είτε 2 εφαρμογές με δόση 60 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού, η 1η εφαρμογή στην έναρξη της άνθησης και η 2η 3 μέρες αργότερα πριν το τέλος της άνθησης. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30-100 λίτρα /στρέμμα.

Παρατηρήσεις:

1) Για τη μηλιά: Χρησιμοποιήστε τις υψηλότερες προτεινόμενες δόσεις και τον μεγαλύτερο αριθμό διαδοχικών εφαρμογών όταν ο κίνδυνος σκωριόχρωσης είναι υψηλός χωρίς να ξεπεράσετε συνολικά τα 200 κ.εκ./στρέμμα.

2) Για την αχλαδιά, οι δόσεις και ο αριθμός εφαρμογών πρέπει να προσαρμόζονται στις ειδικές συνθήκες του οπωρώνα λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλία, τις συνθήκες άνθησης και τις καιρικές συνθήκες. Στην περίπτωση των 2 διαδοχικών εφαρμογών, οι εφαρμογές πρέπει να γίνουν κατά την άνθηση σε ξύλο ηλικίας 2 ετών και 1 έτους αντίστοιχα. Λάβετε όλες τις απαραίτητες πρακτικές διαχείρισης του οπωρώνα ώστε να επιτευχθεί υψηλότερη καρπώδεση.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος πλήρους κάλυψης μέχρι απορροής

Τρόπος παρασκευής του διαλύματος εφαρμογής: Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό υπό ανάδευση. Συμπληρώστε στο ψεκαστικό το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση. Διατηρήστε την ανάδευση και κατά τον ψεκασμό. Ελέγξτε το pH του ψεκαστικού διαλύματος και αν χρειαστεί, ρυθμίστε το pH του νερού στο 5-7 χρησιμοποιώντας κατάλληλο προϊόν.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό.

Συνδυαστικότητα: Μην το αναμιγνύετε με άλλα προϊόντα

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Υπό ειδικές συνθήκες, η εφαρμογή μπορεί να μειώσει την ανθοφορία την επόμενη χρονιά. Όταν εφαρμόζεται μετά από φαινόμενο παγετού, το NOVAGIB αυξάνει την καρπώδεση στην αχλαδιά.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Δεν θα πρέπει να εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τις επιφάνειες των φύλλων

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης: Όταν διατηρείται στην αρχική του συσκευασία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος το προϊόν είναι σταθερό για δύο τουλάχιστον χρόνια.